



## LES CONTRE-INDICATIONS ET TRAITEMENTS AVANT / APRÈS



*Vous souhaitez réaliser un maquillage permanent, et je vous remercie de votre confiance. Voici les différentes informations nécessaires à celui-ci. Merci d'en prendre connaissance*

### *Les contre-indications*

Ne pas être enceinte, Ne pas allaiter, Ne pas avoir d'allergie grave, Les cas de diabète insulino-dépendant, Les cas d'acné traitée par isotrétinoïne, Les maladies de peau évolutives, Ne pas être sous traitement médicamenteux, Ne pas être sous l'emprise d'alcool ou de drogue, Les maladies de peau évolutives, Pour la bouche, les injections de silicone, Les boutons de fièvre (herpès labial) Concernant la pigmentation des lèvres, si vous êtes sujette à l'herpès ou aux boutons de fièvre, et avant tout acte de maquillage permanent des lèvres, un traitement préventif est recommandé. Consulter votre médecin traitant afin de suivre un traitement préventif. Pour les mineures une autorisation parentale est obligatoire.

### *Tout ce qu'il faut savoir avant l'acte :*

Avant de pratiquer tout acte de maquillage permanent vous devez prendre connaissance des contre-indications absolues. CF CI- DESSUS.

Un premier RDV téléphonique ou de visu est nécessaire et obligatoire afin de rechercher les contre-indications et d'expliquer l'acte. Durant cette consultation sont abordés les recommandations, les précautions, les traitements particuliers et les réponses à vos questions.

\*\*\*\*\*

Votre prestation se déroule en deux séances. Une retouche doit se tenir 3 à 4 semaines après votre première séance, Pensez à réserver dès à présent votre rendez-vous.

\*\*\*\*\*

## PRECAUTIONS PREALABLES

Préalablement à votre séance de Maquillage Permanent et afin d'en assurer la longévité, nous vous conseillons et ce sans aucune obligation, quelle que soit la zone concernée, et durant les 3 jours qui précèdent l'intervention de :

1 / Se faire prescrire de l'EXTRANAZE ( 3 COMP matin/midi/soir-3 jours) ou PROTEOCHOC ( 3 COMP matin/midi/soir -3jours)

2 / Ne surtout pas prendre d'aspirine durant 5 jours qui précèdent l'intervention.

3 / Vous devez impérativement remplir le consentement éclairé disponible sur notre site à imprimer ou à remplir sur place ou le cas échéant, demandez l'avis de votre médecin en cas de doute.

### TRAITEMENTS PARTICULIERS EN FONCTION DE LA ZONE PIGMENTEE :

	<u>AVANT</u>	<u>APRÈS</u>
<i>Yeux</i>	<p>Se faire prescrire de l'EXTRANASE afin d'éviter les gonflements.</p> <p>(3 comprimés matin/ midi/ soir durant les 3 jours qui précèdent l'acte).</p>	<p>Nettoyer les yeux au collyre VITABACT (2x/jour matin et soir durant 7 jours).</p> <p>Puis, appliquer la crème VITAMINE A DULCIS (2x/jour matin et soir durant 7 jours) Poursuivre l'EXTRANAZE (3 comprimés 3x/jour, matin, midi et soir durant 3 jours).</p>
<i>Sourcils</i>	<p>Effectuer un gommage doux 48 heures avant la séance pour permettre d'éliminer les cellules mortes et de libérer la pilosité naissante du sourcil.</p>	<p>Ne rien appliquer sur la zone 48h après la prestation. Ne pas mouiller la zone. Ne pas gratter ne pas enlever les croûtes. Passer ce délai, appliquer l'AFTER INK (2x/jour en couche fine).</p> <p>Afin de faciliter et améliorer la cicatrisation vous pouvez également prendre du PROTEOCHOC.</p> <p>N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin traitant ou votre pharmacien. En cas de sensation de gonflement, appliquer des compresses glacées imbibées de sérum</p>
<i>Bouche</i>	<p>Se faire prescrire de l'EXTRANASE afin d'éviter les gonflements. (3 comprimés 3X/jour matin/ matin / soir durant 3 jours).</p> <p>Nous vous conseillons de prévoir pour votre retour à domicile, une poche de glace afin d'éviter d'éventuels œdèmes.</p> <p>Si vous êtes sujet aux <b>boutons de fièvre et/ou herpès</b>, se faire prescrire en prévention par un médecin traitant, un traitement antiviral à prendre <u>avant et après</u> la prestation)</p> <p>*Une grande attention doit toujours être portée aux personnes présentant un terrain allergique connu.</p>	<p>Le lendemain de la pigmentation, nettoyer la zone avec une compresse et du désinfectant. Poursuivre l'EXTRANASE (3 comprimés 3x/jour, matin, midi et soir durant 3 jours).</p> <p>Afin de faciliter et améliorer la cicatrisation vous pouvez également prendre du PROTEOCHOC.</p> <p>N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin traitant ou votre pharmacien. Appliquer le baume AFTER INK LIPS en couche fine aussi souvent que possible (3x/jour min)</p> <p>Si vous êtes sujet aux boutons de fièvre et / ou d'herpès, continuer la prise du traitement antiviral 3 jours avant et 3 jours après l'intervention.</p>

## Et après l'acte ?

Il convient de respecter quelques consignes simples qui sont à effectuer jusqu'à complète cicatrisation (1 mois environ).

° Veuillez nettoyer la zone pigmentée avec les mains propres, désinfecter avec de la CHLORHEXIDINE et appliquer aussi souvent que possible la crème EASY TATTOO (sauf pour les yeux) ou le baume AFTER INK LIPS.

° Veuillez ne pas vous exposer au soleil (ou UV) jusqu'à totale cicatrisation afin de prévenir d'éventuelles tâches d'hyper pigmentation. Par la suite, évitez de vous exposer sans appliquer une crème solaire indice 50.

° Veuillez éviter toute source de chaleur, d'humidité et d'irritation (piscine, hammam, sauna, bain) ainsi que des soins tels que gommage, peeling, teinture, décoloration, permanente de cils.

° Veuillez ne pas appliquer de crème à base d'acide de fruit type AHA à la vitamine A acide.

### BON A SAVOIR

° Si de l'eau entre en contact de vos sourcils, retirez celle-ci en tapotant sur la zone à l'aide d'un mouchoir.

° Si des croûtes se détachent en pelant, il est important de ne pas les gratter. Vous devra appliquer la crème AFTER INK ou AFTER IN LIPS elles se détacheront seules au bout de 4/5 jours. Les réactions possibles sont des rougeurs, des oedèmes, ecchymoses, hématomes, sensibilité de la peau et démangeaisons sur et autour pigmenté. Ces inconvénients sont passagers et disparaissent au bout de quelques jours.

° La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de sa réalisation. Elle s'éclaircira de 30% pour les sourcils et 40% pour les lèvres.

° Lors de la retouche une éventuelle correction de forme et / ou de couleur sera possible.

SIGNATURE + MENTION MANUSCRITE  
« Lu et approuvé, bon pour autorisation »